

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



| IMPfung | ALTER | in Wochen | | in Monaten | | | | | | | in Jahren | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|---|------------|------|-----------------|-----|----|-------|----|-----------|-----|--------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|--------|-----------------|----|-----------------|-----------------|
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11* | 12 | 13-14 | 15 | 16-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-14 | 15-16 | 17 | ab 18 | ab 60 | | | | |
| | | U4 | | U5 | | | U6 | | | | U7 | | U7a/U8 | | U9 | | U10 | | U11/11 | | J2 | | |
| Rotaviren | | G1 ^a | | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tetanus ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | N | | | A1 | N | A2 | N | | | | A ^e | | | |
| Diphtherie ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | N | | | A1 | N | A2 | N | | | | A ^e | | | |
| Keuchhusten ^b Pertussis | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | N | | | A1 | N | A2 | N | | | | A3 ^e | N | | |
| Hib ^b Haemophilus influenzae Typ b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | N | | | | | | | | | | | | | |
| Kinderlähmung ^b Poliomyelitis | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | | N | | | | A1 | | | | | N | | | |
| Hepatitis B ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | | | | N | | | | | | | | | | |
| Pneumokokken ^b | | G1 | N | G2 | N | G3 ^c | | | | N | | | | | | | | | | | | S ^g | |
| Meningokokken C | | | | | | | | G1 | | | | | | N | | | | | | | | | |
| Masern | | | | | | G1 | N | | G2 | | | | | N | | | | | | | | S ^f | |
| Mumps, Röteln | | | | | | G1 | N | | G2 | | | | | N | | | | | | | | | |
| Windpocken Varizellen | | | | | | G1 | N | | G2 | | | | | N | | | | | | | | | |
| HPV Humane Papillomviren | | | | | | | | | | | | | | G1 ^d | G2 ^d | N | | | | | | | |
| Herpes zoster | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G1 ^h | G2 ^h |
| Grippe Influenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S (jährlich) |

Nächste Impftermine



ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfsreihe)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter \geq 15 Jahren oder bei Impfabstand von $<$ 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen \geq 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
 - g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
 - h** Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.